

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	消化器内科 TS-1+CDDP(70mg/m ²)+RT療法	臨床区分	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	抗癌剤適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	登録日	2015年10月26日
疾患名	食道癌					1クール期間	35日
診療科名	消化器内科					実施回数	/回
登録医師名	松枝 克典						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日														注意コメント
							day1	-	-	-	-	day8	day9	day10	-	-	day14	-			
1	S-1	80	mg/m ²	経口			●	→	→	→	→	→	→	→	→	休	day1~day14 14日間 21日間休薬				
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること				
3	ソルテム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-					
4	アプレピタントカプセル125mg	1		経口			-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服				
5	アプレピタントカプセル80mg	1		経口			-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	2日目を降、午前中内服				
6	ソルアセトD輸液 デキササート注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-					
7	ソルテム3A輸液 デキササート注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-					
8	生理食塩液 パロブセトロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-					
9	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-					
10	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	適宜 70	mL mg/m ²	点滴静注	メイン	24h	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	全量2000mLに調製する。 避光にて投与する。 TS-1が処方されているか確認すること。(TS-1 day8)				
11	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-					
12	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-					

備考欄

RT：3週間を1コース 放射線は1日2Gy、週10Gy照射（計2コース）
奏功例はRT治療なしで継続
TS-1：Maximum dose:100mg/body/day

減量・中止基準

--

文献

Concurrent Chemoradiotherapy with a Novel Fluoropyrimidine,S-1,and Cisplatin for Locally Advanced Esophageal Cancer:Long-Term Results of a Phase II Trial