

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | |
|--------|--|
| レジメン名称 | 食道癌 Pembro+FP 療法 (S.hydratation+infuserpump) |
| 疾患名 | 食道癌 |
| 診療科名 | 外科 |
| 登録医師名 | 常光 洋輔 |
| 適応 | 根治切除不能な進行再発食道癌の一次治療 |

臨床区分

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 |
| <input type="checkbox"/> 治験 |

抗癌剤適応分類

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 局所療法 |
| <input type="checkbox"/> その他 |

| | |
|--------|-----------|
| 登録日 | 2022年2月3日 |
| 1クール期間 | 21日 |
| 実施回数 | 最大6回 |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | 注意コメント | |
|----|-----------------------------|-------------|-------------------------|------|-----|-------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| | | | | | | | day1 | day2 | day3 | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1 | パリアナ0.75mg/100単位/mL注射液 10mg | 1 | 本 | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 生理食塩液 | 250 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること |
| 3 | 生理食塩液 キイトルーダ点滴静注 | 100 200 | mL mg | 点滴静注 | メイン | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | インラインフィルターを使用すること |
| 4 | 生理食塩液 | 50 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | キイトルーダ投与後フラッシュ用 |
| 5 | ソルデム3A輸液 静注用マグネシウム | 500 0.5 | mL 管 | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | アプレピタント | 125 | mg | 経口 | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シスプラチン投与の1時間~1時間半前に服用 ※内服が出来ない場合は点滴に切り替え |
| 7 | アプレピタント | 80 | mg | 経口 | | | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 午前中に服用 |
| 8 | ソルアセトD輸液 デキザート注射液 6.6mg | 500 1.5 | mL 瓶 | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ソルデム3A輸液 デキザート注射液 6.6mg | 500 1 | mL 瓶 | 点滴静注 | メイン | 60min | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 生理食塩液 パロプセドロン静注0.75mg | 20 1 | mL 瓶 | 静注 | 側管 | 緩徐に | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 20%マンニトールS注射液 | 300 | mL | 点滴静注 | メイン | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 生理食塩液 シスプラチン点滴静注液 | 250 80 | mL mg/m ² | 点滴静注 | メイン | 90min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全量500mLに調製する |
| 13 | ソルデム3A輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ソルアセトD輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液 | 4000 150 | mg/m ² mL | 持続点滴 | ポート | 120h | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1)インフューザーポンプ使用 2)全量250mLに調製(5日間持続) 3)1日800mg/m ² |
| 16 | パリアナ0.75mg/100単位/mL注射液 10mg | 1 | 本 | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

KEY-Note590試験
※6クール施行後は「Pembro+FU維持療法」に切り替えること