

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| レジメン名称 | 頭頸部癌 Cetuximab + PTX療法               |                 |                         | 臨床区分  |     |        | 抗癌剤適応分類  |     |       | 登録日    | 2021年3月10日 |   |   |   |        |  |
|--------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---|-----|--------|--|-----|-------|--------|------------|---|---|---|--------|--|
| 疾患名    | 頭頸部癌                                 |                 |                         | <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療<br><input type="checkbox"/> 単施設自主研究<br><input type="checkbox"/> 他施設自主研究<br><input type="checkbox"/> 市販後臨床研究<br><input type="checkbox"/> 治験 |     |        | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法<br><input type="checkbox"/> 術後化学療法<br><input type="checkbox"/> 術前化学療法<br><input type="checkbox"/> 局所療法<br><input type="checkbox"/> その他 |     |       | 1クール期間 | 7日         |   |   |   |        |  |
| 診療科名   | 耳鼻咽喉・頭頸部外科                           |                 |                         |   |     |        |  |     |       | 実施回数   | /回         |   |   |   |        |  |
| 登録医師名  | 福島 慶                                 |                 |                         |   |     |        |  |     |       |        |            |   |   |   |        |  |
| 適応     | 転移・再発の頭頸部癌                           |                 |                         |   |     |        |  |     |       |        |            |   |   |   |        |  |
| Rp     | 薬品名称                                 | 標準投与量           | 単位                      | 投与方法  | ルート | 投与時間   | 投与日  |     |       |        |            |   |   |   | 注意コメント |  |
|        |                                      |                 |                         |   |     |        | day1   | -   | -     | -      | -          | - | - | - |        | -  |
| 1      | 生理食塩液                                | 100             | mL                      | 点滴静注  | メイン |        | ●  | -   | -     | -      | -          | - | - | - | -      | 血管確保用<br>※開始から終了までECGモニターを<br>装着すること                                       |
| 2      | 生理食塩液<br>デキサート注射液 6.6mg<br>ボララミン注5mg | 100<br>1<br>1   | mL<br>瓶<br>管            |   |     |        | 点滴静注   | 側管  | 30min | ●      | -          | - | - | - | -      | -  |
| 3      | 生理食塩液<br>アービタックス注射液                  | 300<br>2回目以降250 | mL<br>mL                | 点滴静注  | メイン | 120min | ●  | -   | -     | -      | -          | - | - | - | -      | 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> を60minで投<br>与<br>アービタックス投与終了後、1時間は経過観察<br>すること。 |
| 4      | グラニセトロン点滴静注液3mg/バック<br>ファモチジン静注20mg  | 1<br>1          | 袋<br>管                  |   |     |        | 点滴静注   | メイン | 30min | ●      | -          | - | - | - | -      | -  |
| 5      | 5%糖液<br>パクリタキセル注                     | 250<br>80       | mL<br>mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注  | メイン | 60min  | ●  | -   | -     | -      | -          | - | - | - | -      | フィルター付き点滴セット使用   |
| 6      |                                      |                 |                         |   |     |        |  |     |       |        |            |   |   |   |        |  |

## 備考欄

## 減量・中止基準

## 文献

Phase II study of the combination of cetuximab and weekly paclitaxel in the first-line treatment of patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of head and neck