

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	消化器内科 FOLFIRINOX療法
疾患名	膵臓癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	表 静馬

臨床区分

- ☒ 日常診療
☐ 単施設自主研究
☐ 他施設自主研究
☐ 市販後臨床研究
☐ 治験

抗癌剤適応分類

- ☒ 進行・再発化学療法
☐ 術後化学療法
☐ 術前化学療法
☐ 局所療法
☐ その他

登録日

2014年3月20日

1クール期間

14日

実施回数

/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	アブレヒタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶														
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶														
4	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m2														
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レボホリナート投与開始30分後からイリノテカン同時投与開始
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m2														
6	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レボホリナート投与開始30分後から同時投与開始
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	180	mg/m2														
7	フルオロウラシル点滴静注	400	mg/m2	点滴静注	メイン	全開で	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レボホリナートとイリノテカン終了後15分以内に投与終了
	生理食塩液	50	mL														
8	フルオロウラシル点滴静注	2400	mg/m2	点滴静注	メイン	46h	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ワンバック持続（46時間）
	ソルデム3A輸液	2000	mL														
9																	

備考欄

2～3日目 イメンドカプセル80mg 1日1回 1回1Cap 内服
2～4日目 デカドロン錠0.5mg 1日1回 1回8錠 内服

減量・中止基準

文献

FOLFIRINOX versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer
FOLFIRINOX療法（治療切除不能な膵癌）適正使用情報