

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | |
|--------|---------------------------|
| レジメン名称 | 膵臓癌 modified FOLFIRINOX療法 |
| 疾患名 | 膵臓癌 |
| 診療科名 | 外科 |
| 登録医師名 | 内海 方嗣 |
| 適応 | 局所進行切除不能膵癌 |

臨床区分

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 |
| <input type="checkbox"/> 治験 |

抗癌剤適応分類

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 局所療法 |
| <input type="checkbox"/> その他 |

| | |
|--------|-----------|
| 登録日 | 2022年3月2日 |
| 1クール期間 | 14日 |
| 実施回数 | /回 |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | 注意コメント | |
|----|------------------|-------|-------|------|-----|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----------------------------------|
| | | | | | | | day1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1 | アプレビタントカプセル125mg | 1 | Cap | 経口 | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服 |
| 2 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること |
| 3 | 生理食塩液 | 100 | mL | 点滴静注 | メイン | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | パロノセトロン静注0.75mg | 1 | 瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デキサメトゾン注射液 6.6mg | 1.5 | 瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5%糖液 | 250 | mL | 点滴静注 | メイン | 120min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | オキサリプラチン点滴静注液 | 85 | mg/m2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5%糖液 | 250 | mL | 点滴静注 | メイン | 120min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | レボホリナート投与開始30分後からイリノテカン同時投与開始 |
| | レボホリナート点滴静注用 | 200 | mg/m2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5%糖液 | 250 | mL | 点滴静注 | 側管 | 90min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | レボホリナート投与開始30分後から同時投与開始 |
| | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 | 150 | mg/m2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | フルオロウラシル点滴静注 | 2400 | mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 46h | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワンバック持続(46時間) |
| | ソルデム3A輸液 | 2000 | mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考欄
 2~3日目 イメンドカプセル80mg 1日1回 1回1Cap 内服
 2~4日目 デカドロン錠4mg 1日1回 1回2錠 内服

減量・中止基準

文献
 A Phase II study of modified FOLFIRINOX for chemotherapy naïve patients with metastatic pancreatic cancer