

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	呼吸器内科 CDDP+PEM+BEV療法 (Ultra.S.hydratation)	臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2016年5月11日
疾患名	肺癌	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日
診療科名	呼吸器内科			実施回数	/回
登録医師名	岡田 俊明				

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	100	ml	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
3	アプレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	2日目以降、午前中内服
4	ソルテム3A輸液 デキサード注射液 6.6mg	500 1	ml 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ソルテム3A輸液 静注用マグネシウム	500 0.5	ml 管	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	点滴開始から1分前投与終了までにOS-1又は水分を1L服用する事
6	生理食塩液 パロノセトロン静注用0.75mg デキサード注射液 6.6mg	100 1 1.5	ml 瓶 瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	生理食塩液 パメトシゲド点滴静注用	100 500	ml mg/m2	点滴静注	メイン	10min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	20%マンニトール注射液	300	ml	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	生理食塩液 シスプラチン点滴静注用	300 75	ml mg/m2	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ソルテム3A輸液	500	ml	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	生理食塩液 パバシマブ点滴静注用	100 15	ml mg/kg	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	プラトシン終了後に投与開始 初回90min、2回目60min、3回目以降30min

備考欄
 ①薬液：初回投与の7日目以上前から1日1回0.5mgを連日経口内服する。中止後も最終投与日から22日目まで可能な限り内服する。 ②VB12：初回投与の7日前に1回1mgを筋注する。その後投与期間中及び投与中止後22日目まで9週毎に1回筋注する。 ③5クール目以後はアリムタ+アバシチン後の維持療法

減量・中止基準
 []

文献
 []