

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	呼吸器内科 PEM+BEV療法
疾患名	肺癌（非扁平上皮癌）
診療科名	呼吸器内科
登録医師名	玄馬 顕一

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年10月1日
1クール期間	21日
実施回数	

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック デキサード注射液 6.6mg	1 1	袋 瓶	点滴静注	側管	20min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	生理食塩液 ペメトレギセド点滴静注用	100 500	mL mg/m2	点滴静注	側管	10min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 ペバジスマブ点滴静注用	100 15	mL mg/kg	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		

備考欄

①薬液：初回投与の7日目以前から1日1回0.5mgを連日経口内服する。中止後も最終投与日から22日目まで可能なかぎり内服する。
 ②VB12：初回投与の7日前に1回1mgを筋注する。その後投与期間中及び投与中止後22日目まで9週毎に1回筋注する。
 ③7クール目以後はアリムタ+アバスチンで維持療法

減量・中止基準

文献