

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 ガルトラップ+FOLFIRI療法 (infuser pump)
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	宮宗 秀明

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2017年9月6日
1クール期間	14日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	ムネリナNa0.75mg用100単位/mL注射液 10	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶														
	デキササード注射液 6.6mg	1	瓶														
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) フィルター付き点滴セット使用 2) 投与前後に生理食塩液でラインをフラッシュすること。
	ガルトラップ点滴静注液	4	mg/kg														
6	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとイリノテカンと同時に
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m2														
7	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとイリノテカンと同時に
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150	mg/m2														
8	フルオロウラシル点滴静注	400	mg/m2	点滴静注	側管	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナート終了後 15分以内で投与終了
	生理食塩液	50	mL														
9	フルオロウラシル点滴静注	2400	mg/m2	持続点滴	側管	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インフューザーポンプ（46時間） 全量110mLに調製する。
	生理食塩液	50	mL														
10	ムネリナNa0.75mg用100単位/mL注射液 10	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

備考欄

減量・中止基準

文献
Addition of Aflibercept to Fluorouracil, Leucovorin, and Irinotecan Improves Survival in a Phase III Randomized Trial in Patients With Metastatic Colorectal Cancer Previously Treated With an Oxaliplatin-Based Regimen