

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 FOLFI療法(在宅)							臨床区分	抗癌剤適応分類							登録日	2012年8月4日					
疾患名	大腸癌										<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法						1クール期間	14日			
診療科名	外科										<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法						実施回数	/回			
登録医師名	岩川 和秀										<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術前化学療法										
								<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 局所療法													
								<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> その他													
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント					
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	
1	ハリットNaCl用100単位/mLシリツ 10n	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること			
3	生理食塩液 パロフセトロジ静注0.75mg テキサート注射液 6.6mg	100	mL 瓶 瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	5%糖液 レボホリナート点滴静注用	250 200	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとイリノテカンは同時に			
5	5%糖液 イリノテカント酸塩点滴静注液	250 150	mL mg/m2	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとイリノテカンは同時に			
6	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	400 50	mg/m2 mL	点滴静注	側管	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナート終了後 15分以内で投与終了			
7	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	2400 50	mg/m2 mL	持続点滴	側管	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インフューザーポンプ 全量110mLに調製する。			
8	ハリットNaCl用100単位/mLシリツ 10n	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9																						
10																						
11																						
12																						

備考欄

減量・中止基準

文献