

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	外科 ベクティビックス+mFOLFOX6療法			臨床区分		抗癌剤適応分類		登録日	2012年8月4日							
疾患名	大腸癌			<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験		<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他		1クール期間	14日							
診療科名	外科							実施回数	/回							
登録医師名	岩川 和秀															
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
	ハロノセトロン静注0.75mg	1	瓶				●	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶				●	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	60min※	●	-	-	-	-	-	-	-	-	投与終了後1時間は、経過観察すること インラインフィルターを使用すること
	ベクティビックス点滴静注	6	mg/kg				●	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとエルプラットは同時に
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²				●	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとエルプラットは同時に
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m ²				●	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	フルオロウラシル点滴静注	400	mg/m ²	持続点滴	側管	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとエルプラット終了後 15分以内で投与終了
	生理食塩液	50	mL				●	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	フルオロウラシル点滴静注	2400	mg/m ²	点滴静注	側管	46h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	ワンパック持続（46時間）
	ソルテム3A輸液	2000	mL				●	-	-	-	-	-	-	-	-	
8																

備考欄

※生理食塩液で希釈後の点滴溶液中の本剤の最終濃度は10mg/mLを超えないこと。本剤は、60分以上かけて点滴静注すること。ただし、1回投与量として1,000mgを超える場合は、日局生理食塩液で希釈し約150mLとし、90分以上かけて点滴静注すること。

減量・中止基準

--

文献

--