

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称

外科 BEV+FOLFIRI療法 (在宅)

疾患名

大腸癌

診療科名

外科

登録医師名

岩川 和秀

臨床区分

☒ 日常診療

☐ 単施設自主研究

☐ 他施設自主研究

☐ 市販後臨床研究

☐ 治験

抗癌剤適応分類

☐ 進行・再発化学療法

☐ 術後化学療法

☐ 術前化学療法

☐ 局所療法

☐ その他

登録日

2012年8月4日

1クール期間

14日

実施回数

/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	AL [®] リナNa0.7g用100単位/mLシリンジ 100	1	本	静注			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	パロプセドロン静注0.75mg デキザート注射液 6.6mg	1 1	瓶 瓶														
4	生理食塩液 パバジスマブ点滴静注	100 5	mL mg/kg	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	5%糖液 レボホリナート点滴静注用	250 200	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レボホリナートとイリノテカンは同時に
6	5%糖液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250 150	mL mg/m2	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レボホリナートとイリノテカンは同時に
7	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	400 50	mg/m2 mL	点滴静注	側管	全開で	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レボホリナート終了後 15分以内で投与終了
8	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	2400 50	mg/m2 mL	持続点滴	側管	46h	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インフューザーポンプ（46時間） 全量110mLに調製する。
9	AL [®] リナNa0.7g用100単位/mLシリンジ 100	1	本	静注			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10																	
11																	
12																	

備考欄

減量・中止基準

文献