

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸癌 Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab3剤併用療法	
疾患名	大腸癌	
診療科名	外科	
登録医師名	宮宗 秀明	
適応	BRAF陽性かつ2次治療以降の切除不能進行再発大腸癌	

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2021年3月3日
1クール期間	7日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 アービタックス注射液	300 400	mL mg/m2	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2回目以降 250mg/m ² を60minで投与 2回目は生理食塩液250mLに混注 (予備容量: 140mL) ※濃度0.83~4mg/mLになるよう調製する。 アービタックス投与終了後、1時間は経過観察すること。
5	ピラフトピカプセル	300	mg	経口													1日1回連日投与
6	メクトビ錠	45	mg	経口													1日2回連日投与

備考欄
 ※医師はBRAF検査の実施年月日をカルテ掲示板に記載すること(診療報酬明細書に記載が必要なため)
 ※医師は3剤併用する理由(ECOG PS,転移臓器数、CRP値など)をカルテ掲示板に記載すること(診療報酬明細書に記載が必要なため)

減量・中止基準
 適正使用ガイド参照

文献