

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸がん FOLFOXIRI療法 (在宅)
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	宮宗 秀明

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2018年11月7日
1クール期間	14日
実施回数	12クール/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	M <sup>v</sup> リ <sup>u</sup> Na <sup>0</sup> ク <sup>u</sup> 用100単位/mL <sup>u</sup> ツ <sup>u</sup> 10	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	アプレビタントCap	125	mg	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※抗がん剤投与開始1~1時間半前に服
3	アプレビタントCap	80	mg	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	※午前中に内服
4	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶														
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶														
7	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150~165	mg/m <sup>2</sup>														
8	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時に
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m <sup>2</sup>														
9	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時に
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m <sup>2</sup>														
10	フルオロウラシル注	2400~3200	mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	メイン	48h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インフューザーポンプ(48時間) 合計115mLになるように調製する
	生理食塩液	50	mL														
11	M <sup>v</sup> リ <sup>u</sup> Na <sup>0</sup> ク <sup>u</sup> 用100単位/mL <sup>u</sup> ツ <sup>u</sup> 10	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

備考欄  
Phase III Trial of Infusional Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatin, and Irinotecan (FOLFOXIRI) Compared With Infusional Fluorouracil, Leucovorin, and Irinotecan (FOLFIRI) As First-Line Treatment for Metastatic Colorectal Cancer: The Gruppo Oncologico Nord Ovest (Falcone A, et al. J Clin Oncol. 2007;25:1670-6)

減量・中止基準  

--

文献  

--