

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	扁平上皮癌 Nivolumab+Ipilimumab+CBDCA+PTX療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	
疾患名	扁平上皮癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	42日
診療科名	呼吸器内科				実施回数	1回
登録医師名	岡田 俊明					
適応	未治療の切除不能な進行再発の扁平上皮癌 (EGFR陰性、ALK陰性)					

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	day22	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液 オブジーボ点滴静注	64 360	mL mg/body	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	※インラインフィルターを使用すること。 ※投与終了後30分経過観察すること。
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	オブジーボ投与後、経過観察用
4	生理食塩液 ヤーボイ点滴静注液	50 1	mL mg/kg	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インラインフィルターを使用すること。 ※投与終了後30分経過観察すること。 全量30mLに調製する。 (1～4mg/mLの濃度に希釈すること) ※ミキシング時にボトル内を過度に陰圧にしないこと ヤーボイ投与後経過観察用
5	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	バクリタキセル投与開始30分前までに内服
7	生理食塩液 デキサード注射液 6.6mg ファモチジン静注20mg	100 3 1	mL 瓶 管	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
8	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
9	生理食塩液 バクリタキセル注	500 200	mL mg/m2	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	※フィルター付き点滴セットを使用すること ※ECG・SpO2モニター、15分ごとバイタルチェック
10	生理食塩液 カルボプラチン点滴静注液	250 6	mL AUC	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	

備考欄

※1コース終了後は「非小細胞肺がん Nivolumab+Ipilimumab療法」に移行する

減量・中止基準

文献

CheckMate 9LA