

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	扁平上皮癌 Pembrolizumab+PTX+CBDCA療法
疾患名	扁平上皮癌
診療科名	呼吸器内科
登録医師名	岡田 俊明

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2021年8月25日
1クール期間	21日
実施回数	4回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート※	投与時間	投与日									注意コメント		
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—	—		—	
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内服
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時に投与（レスタミンの内服不可患者は医師に確認）
	デキサメトゾン注射液 6.6mg	3	瓶															
	パロプセドロン静注用0.75mg	1	瓶															
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	キイトルーダ前後ルート洗浄用
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	最終濃度：1~10mg/mL以上 インラインフィルターを使用すること。 キイトルーダ投与前後生食でフラッシュ
	キイトルーダ点滴静注	200	mg															
6	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	180min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インラインフィルターを使用すること。
	パクリタキセル注	200	mg/m ²															
7	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カルボプラチン点滴静注液	6	AUC																

備考欄

※4コース終了後はPembrolizumab療法へ移行する
 ※キイトルーダとパクリタキセルはフィルターを使用する。状況によりイメンドの併用を考慮

減量・中止基準

--

文献

国際共同第III相試験 KEYNOTE-407試験