

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	消化器内科 R-CHOP療法
疾患名	非ホジキンリンパ腫
診療科名	消化器内科
登録医師名	寺尾 正子

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2012年10月1日
1クール期間	21~28日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	-	-	-	-	-	
1	プレドニン錠 5mg	50	mg/m2	経口			●	●	●	●	休	-	-	-	-	-	
2	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	生理食塩液	20	mL	静注	側管	緩徐に	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶														
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	アドリアシン注用	50	mg/m2														
5	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	全開で	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0mg/bodyを上限とする
	オンコピン注射用	1.4	mg/m2														
6	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	注射用エンドキサン	750	mg/m2														
7	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
8	レスタミンコーワ錠 10mg	3	錠	経口			-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ロキソプロフェン錠 60mg	1	錠														
9	生理食塩液	10倍希釈	mL	点滴静注	側管	適宜変動	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	リツキシマブが10倍希釈となるよう調製 ECG/SpO2モニター
	リツキシマブ点滴静注	375	mg/m2														
※	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●										※アドリアシン後のルート洗浄用

備考欄

- 1) プレドニン錠 5mg 1日50mg/m2 1日2回 朝・昼食後 5日間 内服
- 2) リツキシマブ初回投与時は最初の1時間は25mL/時、次の1時間は100mL/時、その後は200mL/時
- 3) 初回投与後、副作用がない場合、2回目以降は、最初の1時間は100mL/時より開始し、その後は200mL/時で投与可能

減量・中止基準

--

文献

--