

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	腎細胞癌 3週毎Pembrolizumab+Axitinib併用療法
疾患名	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
診療科名	泌尿器科
登録医師名	長谷川 泰久

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input checked="" type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2020年10月1日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日														注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	day21	
1	インライタ錠	10	mg	経口			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	連日投与
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100 200	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	最終濃度：1~10mg/mL以上 インラインフィルターを使用すること。
4																					
5																					
6																					

備考欄

アキシチニブとして1回5mgを1日2回経口投与する。患者の状態により、1回10mg1日2回まで増量できる。(副作用により減量する場合は、副作用の症状・重症度に応じて、1回3mg1日2回、又は1回2mg1日2回に減量すること)：添付文書参照

減量・中止基準

インライタ添付文書参照

文献

KEYNOTE-426試験