

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科(癌) CDDP + RT併用療法
疾患名	子宮頸癌
診療科名	婦人科
登録医師名	早瀬 良二

臨床区分

<input type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input checked="" type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2016年5月30日
1クール期間	7日
実施回数	6/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	-	-	-	-	-	-	-		-
1	アプレビタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服
2	アプレビタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	2日目以降、午前中内服
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロプゼドロン静注用0.75mg	1	瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	静注用マグネソール	0.5	瓶	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	生理食塩液	500	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	上限：70mg/body
	シスプラチン点滴静注液	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	

備考欄

※体表面積から計算されたCDDPの投与量は、1mg/body (2mL) 単位で切り捨てて決定する。  
 ※登録時の体重に比して±5kg以内の場合は投与量の補正は行わないが、±5kgを超える体重変動がみられた場合は、体表面積を再計算して投与量を再度決定する。また、再計算を行った以降、さらに再計算時の体重に比して±5kgを超える体重変動がみられた場合は、体表面積を再計算して投与量を再度決定する。

文献

《臨床研究》  
 子宮頸がん根治的放射線治療における組織内照射併用腔内照射の第I/II相試験

減量・中止基準

※延期基準(何れか該当)  
 全身状態→PS3以上、体温38℃以上 骨髓機能→好中球数：1,000/mm<sup>3</sup>未満、血小板数：75,000/mm<sup>3</sup>未満  
 肝臓→AST、ALT:101 IU以上、総ビリルビン：2.0mg/dL以上 腎臓→血清クレアチニン：1.5mg/dL以上  
 胃腸→下痢、便秘、吐瀉：Grade3以上 神経→末梢神経障害(運動性・感覚性)：Grade3以上  
 耳・迷路→聴覚障害：Grade2以上 その他(脱毛、疲労、食欲不振を除く)→その他の非血液毒性Grade3以上

※CDDP減量基準  
 好中球減少：Grade3 (1,000/mm<sup>3</sup>未満)以上 血小板減少：Grade3 (50,000/mm<sup>3</sup>未満)以上  
 血清クレアチニン上昇：1.5mg/dL以上 末梢神経障害(運動性・感覚性)：Grade2以上  
 聴覚障害：Grade2以上 上記以外の非血液毒性(悪心・嘔吐、食欲不振、疲労を除く)：Grade3以上