

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	子宮体癌 6週毎 Pembrolizumab+Lenvatinib併用療法
疾患名	子宮体癌
診療科名	婦人科
登録医師名	山本 暖
適用	がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2022年3月2日
1クール期間	42日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日														注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	day42	
1	レンビマカプセル	20	mg	経口			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	連日投与	
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること	
3	生理食塩液 キイトルニダ点滴静注	100 400	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	最終濃度：1~10mg/mL以上 インラインフィルターを使用すること。	
4																					
5																					
6																					

備考欄
 プラチナ製剤を含む化学療法を行っていることを確認すること。
 レンバチニブとして1日1回20mgを連日経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

減量・中止基準
 レンビマ添付文書参照

文献
 KEYNOTE-775/309試験