

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸がん BEV+FOLFOXIRI療法 (ワンパック)
疾患名	大腸癌
診療科名	外科
登録医師名	宮宗 秀明

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2018年11月7日
1クール期間	14日
実施回数	12クール/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	アプレビタントcap	125	mg	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※抗がん剤投与開始1~1時間半前に服用すること
3	アプレビタントcap	80	mg	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	※午前中に内服
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロプセトロン静注0.75mg	1	瓶															
6	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※投与前後に生理食塩液でラインフラッシュすること ※初回90min 忍容性があれば、2回目60min 3回目以降30minまで短縮可
	ペバシズマブ点滴静注	5	mg/kg															
7	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150~165	mg/m ²															
8	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時
	レボホリナート点滴静注用	200	mg/m ²															
9	5%糖液	250	mL	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時
	オキサリプラチン点滴静注液	85	mg/m ²															
10	フルオロウラシル注	2400~3200	mg/m ²	持続点滴	メイン	48h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ソルデム3A輸液	2000	mL															

備考欄
FOLFOXIRI plus bevacizumab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer, phase3 TRIBE study(Lancet Oncol.2015 OCT;16(13):1306-15)

減量・中止基準

文献