

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	大腸がん BEV+FOLFOXIRI療法 (在宅)		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2018年11月7日	
疾患名	大腸癌		<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 <input type="checkbox"/> 治験	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> 局所療法 <input type="checkbox"/> その他	1クール期間	14日	
診療科名	外科				実施回数	12クール/回	
登録医師名	宮宗 秀明						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	M ⁺ リ ⁺ Na ⁺ 用100単位/mLリ ⁺ 10	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	アプレピタントcap	125	mg	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※抗がん剤投与開始1～1時間半前に服用すること
3	アプレピタントcap	80	mg	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	※午前中に内服
4	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
5	生理食塩液 パロノセトロン静注0.75mg デキサート注射液 6.6mg	100 1 1.5	mL 瓶 瓶	点滴静注	メイン	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	生理食塩液 ヘパシマブ点滴静注	100 5	mL mg/kg	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※投与前後に生理食塩液でラインフラッシュすること ※初回90min 忍容性があれば、2回目60min 3回目以降30minまで短縮可
7	5%糖液 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250 150~165	mL mg/m ²	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	5%糖液 レボホリナート点滴静注用	250 200	mL mg/m ²	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時
9	5%糖液 オキサリプラチン点滴静注液	250 85	mL mg/m ²	点滴静注	側管	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時
10	フルオロウラシル注 生理食塩液	2400~3200 50	mg/m ² mL	持続点滴	メイン	48h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インフューザーポンプ（48時間） 全量115mLに調製する。
11	M ⁺ リ ⁺ Na ⁺ 用100単位/mLリ ⁺ 10	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

備考欄
 FOLFOXIRI plus bevacizumab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer, phase3 TRIBE study(Lancet Oncol.2015 OCT;16(13):1306-15)

減量・中止基準

--

文献

--