

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	肛門癌 FP (5-FU+CDDP) +RT療法 (S,hydration+Infuser pump)
疾患名	肛門癌
診療科名	外科
登録医師名	大塚 眞哉
適用	局所進行の肛門癌

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2022年4月6日
1クール期間	28日
実施回数	2/回

Rb	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	-	-	-	-	-	-	
1	NaClリナリン酸ナトリウム100単位/mL注射液 10mL	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	ソルデム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1~1時間30分前に内服
5	アプレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	2日目以降、午前中内服
6	ソルアセトD輸液 デキザント注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ソルデム3A輸液 デキザント注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
8	生理食塩液 パロプロセトロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	生理食塩液 ジスプラチン点滴静注液	250 60	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全量500mLに調製する
11	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
12	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
13	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	4000 150	mg/m <sup>2</sup> mL	持続点滴	ポート	96h	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) インフューザーポンプ使用 2) 全量200mLに調製 (4日間持続) 3) 1日1000mg/m <sup>2</sup>
14	NaClリナリン酸ナトリウム100単位/mL注射液 10mL	1	本	静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

備考欄

遠隔転移のある肛門癌には適応不可  
RTと併用で2コースまで施行

減量・中止基準

--

文献

Mitomycin or cisplatin chemoradiation with or without maintenance chemotherapy for treatment of squamous-cell carcinoma of the anus (ACT II) : a randomised, phase 3, open-label, 2x2 factorial trial