

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 Nivo+FP 療法 (S.hydration+infuserpump)		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2022年7月19日	
疾患名	食道癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	28日	
診療科名	内科				実施期間	最長24ヶ月	
登録医師名	住井 遼平						
適応	根治切除不能な進行再発食道癌の一次治療						

Rb	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	—	—	—	—	—	—	—	
1	Al ^{III} リナレートナトリウム100単位/mLシリンジ 10mL	1	本	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液 オブジーボ点滴静注	52 480	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※インラインフィルターを使用すること ※投与終了後30分経過観察すること。
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オブジーボ投与後、経過観察用
5	ソルデム3A輸液 静注用マグネシウム	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	アブレヒタント	125	mg	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	シスプラチン投与の1時間～1時間半前に服用※内服が出来ない場合は点滴に切り替えること
7	アブレヒタント	80	mg	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	午前中に服用
8	ソルアセトD輸液 デキザード注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	ソルデム3A輸液 デキザード注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
10	生理食塩液 パロフセトロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	生理食塩液 ジスプラチン点滴静注液	250 80	mL mg/m2	点滴静注	メイン	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	全量500mLに調製する
13	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
14	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
15	フルオロウラシル点滴静注 生理食塩液	4000 150	mg/m2 mL	持続点滴	ポート	120h	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1)インフューザーポンプ使用 2)全量250mLに調製（5日間持続） 3)1日800mg/m2
16	Al ^{III} リナレートナトリウム100単位/mLシリンジ 10mL	1	本	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

参考文献・備考
 Check Mate 648試験(Doki.Y, et al, N Engl J Med 2022 ; 386 : 449-462)
 本レジメンの投与期間は投与開始から最長24ヶ月とする。FP療法のみ継続することは可能。

減量・中止基準
 オブジーボ・ヤーボイ AEマネジメントブック 食道癌編