

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

| | |
|--------|------------------------------------|
| レジメン名称 | 食道癌 Nivo+FP 療法 (S,hydration+ワンバック) |
| 疾患名 | 食道癌 |
| 診療科名 | 内科 |
| 登録医師名 | 住井 遼平 |
| 適応 | 根治切除不能な進行再発食道癌の一次治療 |

臨床区分

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療 |
| <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 他施設自主研究 |
| <input type="checkbox"/> 市販後臨床研究 |
| <input type="checkbox"/> 治験 |

抗癌剤適応分類

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術後化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 術前化学療法 |
| <input type="checkbox"/> 局所療法 |
| <input type="checkbox"/> その他 |

| | |
|--------|------------|
| 登録日 | 2022年7月19日 |
| 1クール期間 | 28日 |
| 実施期間 | 最長24ヶ月 |

| Rp | 薬品名称 | 標準投与量 | 単位 | 投与方法 | ルート | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | 注意コメント |
|----|----------------------------|-------------|-------------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 生理食塩液 | 250 | mL | 点滴静注 | メイン | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること |
| 2 | 生理食塩液 オブジーボ点滴静注 | 52 480 | mL mg | 点滴静注 | メイン | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ※インラインフィルターを使用すること ※投与終了後30分経過観察すること。 |
| 3 | 生理食塩液 | 50 | mL | 点滴静注 | メイン | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | オブジーボ投与後、経過観察用 |
| 4 | ソルテム3A輸液 静注用マグネソール | 500 0.5 | mL 管 | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | アプレピタント | 125 | mg | 経口 | | | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | シスプラチン投与の1時間～1時間半前に服 ※内服が出来ない場合は点滴に切り替えること |
| 6 | アプレピタント | 80 | mg | 経口 | | | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 午前中に服用 |
| 7 | ソルアセトD輸液 デキサード注射液 6.6mg | 500 1.5 | mL 瓶 | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | ソルテム3A輸液 デキサード注射液 6.6mg | 500 1 | mL 瓶 | 点滴静注 | メイン | 60min | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 生理食塩液 パロゾセドロン静注0.75mg | 20 1 | mL 瓶 | 静注 | 側管 | 緩徐に | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 20%マンニトールS注射液 | 300 | mL | 点滴静注 | メイン | 30min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 生理食塩液 ジスプラチン点滴静注液 | 250 80 | mL mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 90min | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全量500mLに調製する |
| 12 | ソルテム3A輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ソルアセトD輸液 | 500 | mL | 点滴静注 | メイン | 60min | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | フルオロウラシル点滴静注 ソルテム3A輸液 | 800 1000 | mg/m2 mL | 持続点滴 | メイン | 24h | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ワンバックで調製 |

参考文献・備考

Check Mate 648試験(Doki.Y, et al, N Engl J Med 2022; 386: 449-462)
本レジメンの投与期間は投与開始から最長24ヶ月とする。FP療法のみ継続することは可能。

減量・中止基準

オブジーボ・ヤーボイ AEマネジメントブック 食道癌編