

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胸腺腫/胸腺癌 CAP (CPA+ADM+CDDP) 療法(Ultra.Shydration)
疾患名	胸腺腫/胸腺癌
診療科名	呼吸器内科
登録医師名	岡田 俊明

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2022年11月25日
1クール期間	21日
実施回数	8回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	day2	day3	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	250	ml	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※閉鎖式ルートを使用すること ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	アプレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤1時間~1時間30分前に内服
3	アプレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	2日目で降、午前中に内服
4	ソルテム3A輸液 デキサート注射液 6.6mg	500 1	ml 瓶	点滴静注	メイン	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ソルテム3A輸液 静注用マクネソール	500 0.5	ml 管	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	点滴開始から30分投与終了までにOS-1又は水分を1L服用すること
6	生理食塩液 パロゾセトロン静注用0.75mg デキサート注射液 6.6mg	100 1 1.5	ml 瓶 瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	生理食塩液 ドキソルビジン注	50 50	ml mg/m2	点滴静注	側管	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	生理食塩液	50	ml	点滴静注	側管	全開	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※ドキソルビジン後のルート洗浄用
9	20%マンニトール注射液	300	ml	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	生理食塩液 ジスプラチン点滴静注液	300 50	ml mg/m2	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ソルテム3A輸液	500	ml	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	生理食塩液 注射用エドキシサン	100 500	ml mg/m2	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

備考欄
最大8コース目まで

減量・中止基準

文献
Cisplatin plus doxorubicin plus cyclophosphamide in metastatic or recurrent thymoma: final results of an intergroup trial. The Eastern Cooperative Oncology Group, Southwest Oncology Group, and Southeastern Cancer Study Group. JCO 1994;12 (6) ,1164-8