

## 国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	食道癌 NAC DCF (DTX+5-FU+CDDP) 静注 (Shydratation+ワンバック法)				臨床区分		抗がん剤適応分類		登録日	2022年12月7日							
疾患名	食道癌								<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療	<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法							
診療科名	外科								<input type="checkbox"/> 単施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術後化学療法							
登録医師名	常光 洋輔								<input type="checkbox"/> 他施設自主研究	<input type="checkbox"/> 術前化学療法							
適応	切除可能な局所進行食道扁平上皮癌				<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究	<input type="checkbox"/> 局所療法											
					<input type="checkbox"/> 治験	<input type="checkbox"/> その他	1クール期間	21日									
							実施回数	3/回									
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	day1	day2	day3	day4	day5	—	—	—	—	—	注意コメント
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
2	アフレピタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤1時間～1時間30分前に内服
3	アフレピタントカプセル80mg	1	Cap	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2日目以降、午前中に内服
4	ソルテム3A輸液 静注用マグネツール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	ソルアセトD輸液 テキサード注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	ソルテム3A輸液 テキサード注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液 パロノセトロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	5%糖液 下セタキセル点滴静注液	250 70	mL mg/m2	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	20%マンニットールS注射液	300	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	生理食塩液 シスプラチニン点滴静注液	250 70	mL mg/m2	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	全量500mLに調製する	
11	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	フルオロウラシル点滴静注 ソルテム3A輸液	750 1000	mg/m2 mL	持続点滴	側管	24h	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	ワンバックで調整
14																	

## 備考欄

術前に3コースまで使用する

## 減量・中止基準

## 文献

A randomized controlled phase III trial comparing two chemotherapy regimen and chemoradiotherapy regimen as neoadjuvant treatment for locally advanced esophageal cancer, JCOG 1109 NEXT study