

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	早期TNBC (NAC①) Pembrolizumab+weekly (PTX+CBDCA) 療法	
疾患名	乳癌	
診療科名	乳腺・甲状腺外科	
登録医師名	三好 和也	
適応	高リスクの早期TNBC*1の術前療法① (*1: T1cN1-2またはT2-4N0-2のトリプルネガティブ乳癌)	

臨床区分

<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類

<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input checked="" type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2022年12月7日
1クール期間	21日
実施回数	4回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント	
							day1	-	day8	-	day15	-	-	-		-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	●	-	●	-	-	-	-	血管確保用（フィルター付ルートを使用すること） ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100 200	mL mg	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	最終濃度：1~10mg/mL以上 インラインフィルターを使用すること。 キイトルーダ投与前後生食でフラッシュ
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管		●	-	-	-	-	-	-	-	-	キイトルーダ後ルート洗浄用
4	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	-	●	-	●	-	-	-	-	バクリタキセル投与開始30分前までに内
5	生理食塩液 デキサード注射液 6.6mg ファミモチジン注射液 20mg	100 1 1	mL 瓶 管	点滴静注	側管	15min	●	-	●	-	●	-	-	-	-	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
6	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	-	●	-	●	-	-	-	-	
7	生理食塩液 バクリタキセル注	250 80	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	60min	●	-	●	-	●	-	-	-	-	インラインフィルターを使用すること。
8	生理食塩液 カルボプラチン点滴静注液	250 1.5	mL AUC	点滴静注	側管	30min	●	-	●	-	●	-	-	-	-	最大：225mg

備考欄  
 ※4コース終了後はNAC② (Pembrolizumab+ACまたはEC療法)へ移行する  
 ※キイトルーダとバクリタキセルはフィルターを使用する。  
 ※バクリタキセルが継続不可となった場合は、NAC②に移行すること（カルボプラチン+キイトルーダ2剤の併用は認められない）

減量・中止基準  
 各薬剤の添付文書・適正使用ガイド参照

文献  
 KEYNOTE-522試験