

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	非扁平上皮癌 ③ Durvalumab+PEM維持療法	
疾患名	肺癌	
診療科名	呼吸器内科	
登録医師名	岡田 俊明	
適応	Durvalumab+Tremelimumab+CBDCA+PEM療法後の維持療法	

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2023年4月5日
1クール期間	28日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1											
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液 イミフィンジ点滴静注	100 1500	mL mg/body	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インラインフィルターを使用すること。 最終濃度を1~15mg/mlとする。 体重30kg以下の場合は20mg/kgとする。
3	グラニセトロン点滴静注液3mgパック デキサード注射液 6.6mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	生理食塩液 ヘメトレキシド点滴静注用	100 500	mL mg/m2	点滴静注	側管	10min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5																		

備考欄
 Durvalumab + Tremelimumab + CBDCA + PEM療法後の維持療法であることを確認すること
 「①Durvalumab + Tremelimumab + CBDCA + PEM療法→②維持療法初回Durvalumab + Tremelimumab + PEM療法→③本レジメン」
 (※「Ⅲ期化学放射線療法後の維持療法」、「小細胞肺癌 Durvalumab維持療法」とはレジメンが異なるため適応が間違っていないかを確認すること)
 ①葉酸: 初回投与の7日目以上前から1日1回0.5mgを連日経口内服する。中止後も最終投与日から22日目まで可能なかぎり内服する。
 ②VB12: 初回投与の7日前に1回1mgを筋注する。その後投与期間中及び投与中止後22日目まで9週毎に1回筋注する。

減量・中止基準
 ※イミフィンジは体重が30kg以下の場合は20mg/kgに減量する

文献
 POSEIDON試験