

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	ANCA関連血管炎 Rituximab療法
疾患名	ANCA関連血管炎
診療科名	呼吸器内科
登録医師名	岡田 俊明
適応	ANCA関連血管炎

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input checked="" type="checkbox"/> その他

登録日	2023年5月10日
1クール期間	7日
実施回数	4/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	レスタミンコーワ錠 10mg	3	錠	経口			●										リツキシマブ開始前30分前に内服
	ロキソプロフェン錠 60mg	1	錠														
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●										血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	10倍希釈	mL	点滴静注	側管	適宜変動	●										リツキシマブが10倍希釈となるよう調整 ECG/SpO2モニター 15分毎バイタルチェック 初回投与の忍容性が確認出来れば、投与速度を100ml/時から開始して下さい
	リツキシマブ点滴静注	375	mg/m ²														
4																	

備考欄

リツキシマブは最初の1時間は25ml/時、次の1時間は100ml/時、その後は200ml/時と徐々に点滴速度を上げていくこと。
このレジメンの適応は4回までとする。

減量・中止基準

文献

Rituximab versus Cyclophosphamide for ANCA-Associated Vasculitis.
N Engl J Med. 2010 15; 363(3): 221-232