国立病院機構　福山医療センター　レジメン登録・管理表

レジメン名称	卵巣癌　TP+BEV（PTX+CDDP+BEV）療法
疾患名	卵巣癌
診療科名	婦人科
登録医師名	山本　暖

臨床区分
- ☑ 日常診療
- ☐ 単施設自主研究
- ☐ 他施設自主研究
- ☐ 市販後臨床研究
- ☐ 治験

抗癌剤適応分類
- ☑ 進行・再発化学療法
- ☐ 術後化学療法
- ☐ 術前化学療法
- ☐ 局所療法
- ☐ その他

登録日	2023年5月10日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日 day1	day2	day3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	注意コメント
1	アプレピタントカプセル125mg	1	錠	経口			●	ー	ー								抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
2	アプレピタントカプセル80mg	1	錠	経口			ー	●	●								2日目以降、午前中内服
3	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	パクリタキセル投与開始30分前までに内
4	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
5	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg ファモチジン注射液20mｇ	100 3 1	mL 瓶 管	点滴静注	メイン	15min	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
6	生理食塩液 パロノセトロン静注用0.75mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	30min	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
7	生理食塩液 パクリタキセル注	500 175	mL mg/m2	点滴静注	メイン	180min	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	フィルター付き点滴セット使用
8	ソルデム3A輸液 静注用マグネゾール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
9	20%マンニットールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
10	生理食塩液 シスプラチン注	300 50	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
11	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
12	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
13	生理食塩液 アバスチン点滴静注用	100 15	mg mg/kg	点滴静注	メイン	90min	●	ー	ー								初回90min、初回の忍容性が良好であれば 2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば 3回目以降30min 投与前に生食フラッシュすること
14	ソルデム3A輸液 デキサート注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	ー	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
15	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	ー	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	ソルアセトD輸液	500	mL					●	●								

16				点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

カルボプラチンに対して過敏症を起こした症例に使用する。

減量・中止基準

文献