

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	胃癌 TRA+FOLOX療法 (infuser pump)
疾患名	胃癌
診療科名	消化器内科
登録医師名	豊川 達也
適応	HER2(+)、進行再発胃癌の一次治療

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2023年5月26日
1クール期間	42日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント		
							day1	-	-	day15	-	day22	-	day29		-	-
1	M <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> Na <sup>+</sup> 用100単位/mLリ <sup>+</sup> 10n	1	本	静注			●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
2	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	生理食塩液 トラスツスマブBS点滴静注用	250 6~8	mL mg/kg	点滴静注	メイン	90min	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-	初回投与時のみ8mg/kg 2回目以降6mg/kg 初回：90min 2回目以降：30minも可
5	生理食塩液 パロノセトロン静注0.75mg デキサート注射液 6.6mg	100 1 1.5	mL 瓶 瓶	点滴静注	側管	15min	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
6	5%糖液 レボホリナート点滴静注用	250 200	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	120min	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時に
7	5%糖液 オキサリプラチン点滴静注	250 85	mL mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	120min	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	レボホリナートとオキサリプラチンは同時に
8	フルオロウラシル注 生理食塩液	400 50	mg/m <sup>2</sup> mL	点滴静注	側管	全開で	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	レボホリナートとオキサリプラチン終了後15分以内で投与終了
9	フルオロウラシル注 生理食塩液	2400 50	mg/m <sup>2</sup> mL	持続点滴	側管	46h	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	インフューザーポンプ 全量110mLに調製する。
10	M <sup>+</sup> リ <sup>+</sup> Na <sup>+</sup> 用100単位/mLリ <sup>+</sup> 10n	1	本	静注			●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	

備考欄

減量・中止基準

文献  
胃癌治療ガイドライン 第6版