

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	頭頸部癌 Cetuximab+CF療法(S,hydration)		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2014年5月1日
疾患名	頭頸部癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	21日
診療科名	耳鼻咽喉・頭頸部外科					
登録医師名	中谷 宏章					
					実施回数	6/回

Rn	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	—	—	day8	—	day15	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	●	—	●	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	アブレヒタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
3	アブレヒタントカプセル80mg	1	Cap	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2日目以降、午前中内服
4	ソルデム3A輸液 静注用マグネシウム	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	生理食塩液 デキサード注射液 6.6mg ボララミン注5mg	100 1.5 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	生理食塩液 デキサード注射液 6.6mg ボララミン注5mg	100 1 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	30min	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	
7	生理食塩液 ダービタッグS注射液 2回目以降250	300 400 2回目以降250	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	●	—	—	—	—	—	●	—	●	—	2回目以降 250mg/m2を60minで投与 アビタッグ投与終了後、1時間は経過観察すること。
8	ソルデム3A輸液 デキサード注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	側管	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
9	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	生理食塩液 パロプセドロン静注用0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	適量 100	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	全量500mLに調製する。
13	ソルデム3A輸液 S-FU注	1000 1000	mL mg/m2	点滴静注	メイン	24h	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	ワンバックに調製する。
14	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

減量・中止基準

文献

Platinum-Based Chemotherapy plus Cetuximab in Head and Neck Cancer