

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	頭頸部癌 CF(CDDP+5-FU)療法(S,hydration)		臨床区分		抗癌剤適応分類		登録日	2014年5月1日	
疾患名	頭頸部癌		☒ 日常診療		☒ 進行・再発化学療法		1クール期間	28日	
診療科名	耳鼻咽喉・頭頸部外科		☐ 単施設自主研究		☐ 術後化学療法		実施回数	/回	
登録医師名	中谷 宏章		☐ 他施設自主研究		☐ 術前化学療法				
			☐ 市販後臨床研究		☐ 局所療法				
			☐ 治験		☐ その他				

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	ソルデム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	ソルアセトD輸液 デキサード注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	アブレヒタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
5	アブレヒタントカプセル80mg	1	Cap	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	2日目以降、午前中内服
6	ソルデム3A輸液 デキサード注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	側管	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液 パロプセトロン静注用0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	生理食塩液 ジスプラチン点滴静注液	適宜 80	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	全量500mLに調製する。
10	ソルデム3A輸液 フルオロウラシル点滴静注	1000 800	mL mg/m2	点滴静注	メイン	24h	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	ワンバックに調製する。
11	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

減量・中止基準

文献

A Phase III Randomized Study Comparing Cisplatin and Fluorouracil as Single Agents and in Combination for Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck