

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	頭頸部癌 Pembro+CF療法(S,hydration+ワンバック)		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2023年6月7日	
疾患名	頭頸部癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	21日	
診療科名	耳鼻咽喉・頭頸部外科				実施回数	最大6回	
登録医師名	福島 慶						
適応	再発または遠隔転移を有する頭頸部癌						

Rb	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	—	—	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液 キイトルーダ点滴静注	100 200	mL mg	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インラインフィルターを使用すること
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	キイトルーダ投与後フラッシュ用
4	ソルデム3A輸液 静注用マグネソール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	アブレヒタント	125	mg	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	シスプラチン投与の1時間～1時間半前に服用 ※内服が出来ない場合は点滴に切り替え
6	アブレヒタント	80	mg	経口			—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	午前中に服用
7	ソルアセトD輸液 デキザート注射液 6.6mg	500 1.5	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	ソルデム3A輸液 デキザート注射液 6.6mg	500 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	60min	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
9	生理食塩液 パロフセトロン静注0.75mg	20 1	mL 瓶	静注	側管	緩徐に	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	250 100	mL mg/m2	点滴静注	メイン	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	全量500mLに調製する
12	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
13	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
14	フルオロウラシル点滴静注 ソルデム3A輸液	1000 1000	mg/m2 mL	持続点滴	メイン	24h	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	ワンバックで調製

備考欄

※6クール施行後や骨髄抑制を鑑みて「頭頸部癌 Pembrolizumab療法」に切り替えても良い。
※事前にPD-L1陽性の有無を確認し、CPSが1以上（検査データ参照）なければ要確認。
※「頭頸部癌 CF療法」とCDDP、5-FUの投与量が異なることに留意すること

減量・中止基準

文献

KEYNOTE-048試験