

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	頭頸部癌 TPF(DTX+CDDP+5-FU)療法(S,hydration)		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2014年5月1日
疾患名	頭頸部癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	28日
診療科名	耳鼻咽喉・頭頸部外科				実施回数	/回
登録医師名	中谷 宏章					

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	静注用マグネソール	0.5	管														
3	アブレヒタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服
4	アブレヒタントカプセル80mg	1	Cap	経口			-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	2日目以降、午前中内服
5	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶														
6	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
7	生理食塩液	20	mL	静注	側管	緩徐に	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	パロノセトロン静注用0.75mg	1	瓶														
8	5%糖液	250	mL	点滴静注	メイン	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ドセタキセル点滴静注液	75	mg/m2														
9	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	メイン	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	生理食塩液	適宜	mL	点滴静注	メイン	120min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	全量500mLに調製する
	シスプラチン点滴静注液	75	mg/m2														
11	ソルテム3A輸液	1000	mL	持続点滴	メイン	24h	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	ワンバックで調製
	フルオロウラシル点滴静注	750	mg/m2														
12	ソルテム3A輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14																	

備考欄

--

減量・中止基準

--

文献

Cisplatin,Fluorouracil,and Docetaxel in Unresectable Head and Neck Cancer