

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称		圧縮性腫瘍 TTP (PTX+IFM+CCDP) 療法		臨床区分		抗癌剤適応分類		登録日		2016年2月3日	
疾患名		精巣腫瘍		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験		☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他		1クール期間		21日	
診療科名		泌尿器科						実施回数		/回	
登録医師名		宮本 克利									

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日								注意コメント		
							day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8		—	—
1	アブレヒタントカプセル125mg	1	Cap	経口			—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1～1時間30分前に内服
2	アブレヒタントカプセル80mg	1	Cap	経口			—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	2日眼以降、午前中に内服
3	生理食塩水	100	mL	点滴静注	メイン		●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに服用
5	生理食塩水	100	mL	点滴静注	メイン	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
	デキササード注射液 6.6mg	3	瓶														
	パクリタキセル注射液 20mg	1	袋														
6	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	生理食塩水	500	mL														
7	パクリタキセル注	175	mg/m2	点滴静注	メイン	3h	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	生理食塩水	100	mL														
8	グラニセトロン点滴静注液3mg/バック	1	袋	点滴静注	メイン	30min	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	デキササード注射液 6.6mg	1	瓶														
9	生理食塩水	100	mL	点滴静注	メイン	15min	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	イボマイド投与前、以後、4時間毎
	フロセミド注射液	400	mg														
10	生理食塩水	500	mL	点滴静注	メイン	120min	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	注射用イボマイド	1200	mg/m2														
11	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	静注用マグネソール	0.5	管														
12	生理食塩水	100	mL	点滴静注	メイン	15min	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	イボマイド投与前、以後、4時間毎
	フロセミド注射液	400	mg														
13	マンニトールS注射液 300mL	1	袋	点滴静注	側管	30min	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	生理食塩水	500	mL														
14	シスプラチン点滴静注液	20	mg/m2	点滴静注	メイン	120min	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	生理食塩水	500	mL														
15	ソルアセトD輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	生理食塩水	100	mL														
16	フロセミド注射液	400	mg	点滴静注	メイン	15min	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	イボマイド投与前、以後、4時間毎
	生理食塩水	100	mL														
17	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
	生理食塩水	100	mL														
18	デキササード注射液 6.6mg	1	瓶	点滴静注	メイン	15min	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
	生理食塩水	100	mL														
19	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
	生理食塩水	100	mL														
20	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	120min	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
	生理食塩水	100	mL														

備考欄	減量・中止基準

文献
 Paclitaxel/Isofosfamide and Cisplatin Regimen is Feasible for Japanese Patients with Advanced Germ Cell Cancer