

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	尿路上皮癌 dd-MVAC療法	臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2023年11月1日
疾患名	尿路上皮癌	☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☒ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	14日
診療科名	泌尿器科			実施回数	/回
登録医師名	長谷川 泰久				
適応	転移性尿路上皮癌および筋層浸潤性尿路上皮癌				

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液 注射用メソトレギゼート	50 30	mL mg/m2	点滴静注	側管	全開で	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	午前0時まで持続点滴
4	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	午前0時より開始
5	ソルデム3A輸液 静注用マクネゾニル	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	240min	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	アブレヒタントカプセル80mg	1	Cap	経口			—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	3日目以降、午前中内服
7	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	
8	生理食塩液 デキササード注射液 6.6mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	側管	15min	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	
9	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与開始までルートキープ
10	アブレヒタントカプセル125mg	1	Cap	経口			—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1～1時間30分前に内服
11	生理食塩液 パロノセトロン静注0.75mg デキササード注射液 6.6mg	100 1 1.5	mL 瓶 瓶	点滴静注	側管	15min	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	生理食塩液 エグザール注射用	50 3	mL mg/m2	点滴静注	側管	全開で	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	生理食塩液 ドキシルピジン注射用	50 30	mL mg/m2	点滴静注	側管	全開で	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	20%マンニトールS注射液	300	mL	点滴静注	側管	30min	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	生理食塩液 シスプラチン点滴静注液	300 70	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
17	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
18	フィルグラスチム75μg	1	本	皮下注射			—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	化学療法投与前後24時間以内は避けること

備考欄

day2からオランザピン5mg 6日間の併用を考慮すること
※2025/2/5よりジーラスタ使用せず連日のフィルグラスチムへ泌尿器科のコンセンサスを得て変更

減量・中止基準

文献

Neoadjuvant Dose-Dence Methotrxate, Vinblastine, Doxorubicin, and Cisplatin With Pegfilgrastim Support in Muscle-Invasive Urothelial Cancer: Pathologic, Radiologic, and Biomaker Correlates. *J Clin Oncol* 32: 1889-1894