

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	尿路上皮癌 GCD (GEM+CBDCA+DTX) 療法		臨床区分 ☐ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☐ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2016年2月22日
疾患名	尿路上皮癌					
診療科名	泌尿器科					
登録医師名	長谷川 泰久					
					1クール期間	21日
					実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	—	day8	—	—	—	—	—	
1	アブレタントカプセル125mg	1	Cap	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1～1時間30分前に内服
2	アブレタントカプセル80mg	1	Cap				—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
4	生理食塩液	100	mL				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	パロノセトロン静注0.75mg	1	瓶	点滴静注	メイン	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	メイン	15min	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
	ゲムシタピン点滴静注用	1000	mg/m2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液	250	mL	静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	カルボプラチン点滴静注液	5	AUC				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ドセタキセル点滴静注液	70	mg/m2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

減量・中止基準

文献
 Combination therapy consisting of gemcitabine,carboplatin,and docetaxel as an active treatment for advanced urothelial carcinoma