国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称 尿路上皮癌 GD (GEM+DTX) 療法					療法	臨床区分				抗癌剤適応分類					登卸	渌日	2016年2月22日	
疾患名		尿路上皮癌					☑ 日常診療				▼ 進行・再発化学療法							
診療科名		泌尿器科						□ 単施設自主研究 □ 他施設自主研究				□ 術後化学療法 □ 術前化学療法				1クール期間		21日
登録医師名 長谷川 泰久							□ 他他没有主研究 □ 市販後臨床研究				□ 局所療法							
								台験				□ その他				実施回数		/0
Rp		薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	1			投与日							注意コメント
Пр					MC/CX	70 1	الوم الا كرا	day1	_	_	day8	_	_	_	_	_	_	
1	生理食塩液		100	mL	点滴静注	メイン		•	_	_	•	_	_	_	_	_	_	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
2		ロン点滴静注液3mgバック 注射液 6.6mg	1 1	袋 瓶	点滴静注	メイン	15min	•	_	_	•	_	_	_	_	_	_	
3	生理食塩液ゲムシタビ	ン点滴静注用	100 800	mL mg/m2	点滴静注	メイン	30min	•	_	_	•	_	_	_	_	_	_	
4	生理食塩液ドセタキセ	で アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アンドラ アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア	250 40	mL mg/m2	点滴静注	メイン	60min	•	_	_	•	_	_	_	_	_	_	
5																		
備考	補考欄 減量・中止基準														7			

文献

Gemcitabine and docetaxel,an effective second-line chemotherapy for lung metastasis of urothelial carcinoma