

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称		尿路上皮癌 Nivo+GEM+ODDP療法			臨床区分		抗癌剤適応分類		登録日		2025年2月5日	
疾患名	尿路上皮癌			☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間		21日				
診療科名	泌尿器科					実施回数		6/回				
登録医師名	長谷川 泰久											
適応	根治切除不能な尿路上皮癌の1次治療											

Rn	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	—	day8	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	血管確保用
2	生理食塩液 オブジーボ点滴静注	64 360	mL mg/body	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※インラインフィルターを使用すること ※投与終了後30分経過観察すること。
3	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	オブジーボ投与後、経過観察用
4	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	メイン	15min	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
5	生理食塩液 ゲムシタビン点滴静注用	100 1000	mL mg/m2	点滴静注	メイン	30min	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
6	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン		●	→	—	—	—	—	—	—	—	—	午前0時まで持続点滴
7	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	午前0時より開始 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
8	ソルデム3A輸液 静注用マグネソニール	500 0.5	mL 管	点滴静注	メイン	240min	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	アプレヒタントカプセル80mg	1	Cap	経口			—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	3日目以降、午前中内服
10	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	
11	生理食塩液 デキサート注射液 6.6mg	100 1	mL 瓶	点滴静注	側管	15min	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	
12	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与開始までルートキープ
13	アプレヒタントカプセル125mg	1	Cap	経口			—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	抗がん剤投与1～1時間30分前に内服
14	生理食塩液 パロノセトロン静注0.75mg デキサート注射液 6.6mg	100 1 1.5	mL 瓶 瓶	点滴静注	側管	15min	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	マンニトールS注射液 300mL	1	袋	点滴静注	側管	30min	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	生理食塩液 ジスプラヂン点滴静注液	300 70	mL mg/m2	点滴静注	メイン	120min	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	ソルアセトF輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
18	ソルデム3A輸液	500	mL	点滴静注	メイン	240min	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
19																	

備考欄
6サイクル終了後は「尿路上皮癌 Nivolumab維持療法」へ移行すること

減量・中止基準

文献
Nivolumab plus Gemcitabine-Cisplatin in Advanced Urothelial Carcinoma