

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	前立腺癌 Cabazitaxel + PSL療法
疾患名	前立腺癌
診療科名	泌尿器科
登録医師名	長谷川 泰久

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2015年7月1日
1クール期間	21日
実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	-	day3	-	-	-	-	-	-	-	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※プレドニン錠10mgが処方されているか確認すること。 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ジェブタナ投与開始30分前までに投与終了すること。
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
	ポラミン注5mg	1	管														
3	ファモチジン注射液 20mg	1	管	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋														
4	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	1) フィルター付き点滴セット使用 2) 初回、2回目は特に注意深く観察すること。 ※本剤投与開始1時間は頻回にバイタルサインを確認すること。 3) 最終濃度が0.10~0.26mg/mLとなるように調製 ※<25mg: 生食100mL、25~65mg: 生食250mL、>65mg: 生食500mLで調製	
	ジェブタナ点滴静注60mg	25	mg/m2														
5	ジーラスタ皮下注3.6mg	1	本	皮下注					●								
6																	

備考欄

1) プレドニン錠5mg 1日2錠 (10mg) 1回1錠 1日2回 朝、昼食後 連日投与  
2) アルコール含有: アルコール過敏症のある患者は、慎重投与  
3) 重篤な骨髄抑制が起こる恐れがあるので、G-CSF製剤 (ジーラスタ等) の使用を考慮すること。(Day3に投与)

減量・中止基準

--

文献

Predisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial