

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	前立腺癌 Darolutamide+DTX+ADT併用療法
疾患名	前立腺癌
診療科名	泌尿器科
登録医師名	長谷川 泰久
適応	遠隔転移を有するホルモン感受性の前立腺癌

臨床区分
<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療
<input type="checkbox"/> 単施設自主研究
<input type="checkbox"/> 他施設自主研究
<input type="checkbox"/> 市販後臨床研究
<input type="checkbox"/> 治験

抗癌剤適応分類
<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法
<input type="checkbox"/> 術後化学療法
<input type="checkbox"/> 術前化学療法
<input type="checkbox"/> 局所療法
<input type="checkbox"/> その他

登録日	2024年1月10日
1クール期間	21日
実施回数	6/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック デキザート注射液 6.6mg	1 2	袋 瓶	点滴静注	側管	30min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5%糖液 ドセタキセル点滴静注液	250 75	mL mg/m ²	点滴静注	側管	90min	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ニューベクオおよびADTが併用されているか確認すること
4	ニューベクオ錠300mg	4	錠	経口			●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	

備考欄
ステロイドの併用に関しては各医師の裁量によるものとする。
DTX開始6週以内にニューベクオが開始されているか確認すること(同時開始可)
DTX開始12週以内にADT(LHRHアゴニスト/アンタゴニストまたは精巣摘出術)が開始されているか確認すること(同時開始可)

文献
ARASENS試験 (N Engl J Med 2022; 386: 1132-42)

減量・中止基準
発熱性好中球減少症、500/ μ L未満の好中球数が1週間を超えて持続、重度又は累積的皮膚反応、重度末梢性ニューロパチーのいずれかが出現した場合ドセタキセルを60mg/m²へ減量する。
減量後も上記反応が持続した場合ドセタキセルを中止する。
ニューベクオはの減量基準は添付文書参照