

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	呼吸器内科 Ramucirumab+DTX療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2016年9月2日
疾患名	非小細胞肺癌				1クール期間	21日
診療科名	呼吸器内科					
登録医師名	岡田 俊明					
			☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他		

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	レスタミンコーワ錠10mg	5	錠	経口			●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	サイラムザ投与の30min前に内服すること
2	生理食塩液	100	mL				●	—	—	→	—	—	—	—	—	—	
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	瓶	点滴静注	側管	30min	●	—	—	→	—	—	—	—	—	—	レスタミンと同時投与 (レスタミン内服不可患者には医師に確認)
	デキササート注射液 6.6mg	1	瓶														
3	生理食塩液	適宜調整	mL	点滴静注	メイン	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1) フィルター付き点滴セット使用 2) 投与速度：25mg/minを超えないこと。 3) 1クール目は終了後、1時間観察すること。 ※2クール目以降省略可 4) 投与後、生理食塩液でラインをフラッシュすること。 5) 全量250mLに調製する。
	サイラムザ点滴静注液	10	mg/kg														
4	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン	60min	●										
	ドセタキセル点滴静注液	60	mg/m2														

備考欄

減量・中止基準

文献

Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stageⅣ non-small-cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy (REVEL):a multicentre,double-blind,randomised phase 3 trial
 A randomized,double-blind,phaseⅡ study of ramucirumab plus docetaxel vs placebo plus docetaxel in Japanese patients with stageⅣ non-small cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy