

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	非扁平上皮癌 ① Durvalumab+Tremelimumab+CB136+PEM療法		登録日	2023年4月5日
疾患名	非扁平上皮癌		臨床区分	
診療科名	呼吸器内科		抗癌剤適応分類	
登録医師名	岡田 俊明		登録日	2023年4月5日
適応	切除不能な進行・再発の非扁平上皮癌の一次治療 ※PD-L1の発現は問わない (EGFR陰性、ALK陰性)		1クール期間	21日
			実施回数	4回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	250	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること
2	生理食塩液 イジュド点滴静注	100 75	mL mg/body	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インラインフィルターを使用すること。 最終濃度を0.1～10mg/mLとする。 ※最初のコースは投与終了後60分経過観察 すること。(2コース目以降の経過観察は省 略可)
3	生理食塩液 イミフィンジ点滴静注	100 1500	mL mg/body	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	インラインフィルターを使用すること。 最終濃度を1～15mg/mlとする。 体重30kg以下の場合は20mg/kgとする。 ※1コース目は投与終了後60分経過観察する こと。(2コース目以降は経過観察を30分へ 短縮可)
4	生理食塩液	50	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	イミフィンジ投与後、経過観察用
5	パロノセトロン静注用0.75mg デキサミド注射液 6.6mg	1 1.5	管 管	点滴静注	側管	30min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	生理食塩液 ベメトレキセド点滴静注用	100 500	mL mg/m2	点滴静注	側管	10min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	生理食塩液 カルボプラチニ点滴静注液	250 6	mL AUC	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

備考欄

※4コース終了後は「②維持療法初回Durvalumab+Tremelimumab±PEM療法」に移行する
 ①葉酸：初回投与の7日前より前から1日1回0.5mgを連日経口内服する。中止後も最終投与日から22日目まで可能なかぎり内服する。
 ②VB12：初回投与の7日前に1回1mgを筋注する。その後投与期間中及び投与中止後22日目まで9週毎に1回筋注する。

減量・中止基準

※イミフィンジは体重が30kg以下の場合は20mg/kgに減量する

文献

POSEIDON試験