

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 CD (CBDCA+Liposomal Doxorubicin) +BEV療法		臨床区分	抗癌剤適応分類	登録日	2014年3月6日	
疾患名	卵巣癌		☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	1クール期間	28日	
診療科名	婦人科				実施回数	/回	
登録医師名	早瀬 良二						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	—	—	—	day15	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
2	グラセトロン点滴静注液3mgバック デキサート注射液 6.6mg	1 1.5	袋 瓶	点滴静注	側管	15min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	5%糖液	100	mL	点滴静注	側管		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ドキシル投与前後のライフフラッシュ用 ※全量投与はしなくてもよい。
4	5%糖液 ドキシル注	250 30	mL mg/m2	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1) ドキシル投与前後でライフフラッシュを行う。 2) 基本投与時間60min (1mg/minを超えない速度で投与 60min以上になる場合は医師に確認する。) 3) ライフフラッシュ-を使用しないこと。 4) ドキシル投与量90mg未満の場合、5%糖液250mLを使用。ドキシル投与量が90mgを超える場合、5%糖液500mLを使用 5) 手足症候群予防のため手足をクールする。
5	生理食塩液 カルボプラチン点滴静注液	250 5	mL AUC	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	生理食塩液 アバスタチン点滴静注用	100 10	mL mg/kg	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	初回90min、初回の忍容性が良好であれば2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば3回目以降30min
7																	

備考欄

※アバスタチンは保険適応の用法・用量ではありません。

減量・中止基準

文献

A phase II clinical trial of pegylated liposomal doxorubicin and carboplatin plus bevacizumab in patients with platinum-sensitive recurrent ovarian,fallopian tube,or primary peritoneal cancer