

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

|        |                                         |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |           |
|--------|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| レジメン名称 | 婦人科 CD (Liposomal Doxorubicin+CBDCA) 療法 |  | 臨床区分<br><input checked="" type="checkbox"/> 日常診療<br><input type="checkbox"/> 単施設自主研究<br><input type="checkbox"/> 他施設自主研究<br><input type="checkbox"/> 市販後臨床研究<br><input type="checkbox"/> 治験 | 抗癌剤適応分類<br><input type="checkbox"/> 進行・再発化学療法<br><input type="checkbox"/> 術後化学療法<br><input type="checkbox"/> 術前化学療法<br><input type="checkbox"/> 局所療法<br><input type="checkbox"/> その他 | 登録日    | 2012年8月4日 |
| 疾患名    | 再発卵巣癌                                   |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | 1クール期間 | 28日       |
| 診療科名   | 婦人科                                     |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |        |           |
| 登録医師名  | 早瀬 良二                                   |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | 実施回数   | /回        |

| Rp | 薬品名称                                 | 標準投与量     | 単位          | 投与方法 | ルート | 投与時間   | 投与日  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 注意コメント                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------|-----------|-------------|------|-----|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      |           |             |      |     |        | day1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | 生理食塩液                                | 100       | mL          | 点滴静注 | メイン |        | ●    | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 血管確保用<br>※開始から終了までECGモニターを装着すること                                                                                                                                                                            |
|    |                                      |           |             |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | グラニセトロン点滴静注液3mgバック<br>デキサート注射液 6.6mg | 1<br>1.5  | 袋<br>瓶      | 点滴静注 | 側管  | 15min  | ●    | — | — | — | — | — | — | — | — | — |                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | 5%糖液                                 | 100       | mL          | 点滴静注 | 側管  |        | ●    | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ドキシル投与前後のライフウォッチ用<br>※全量投与はしなくてもよい。                                                                                                                                                                         |
|    |                                      |           |             |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 5%糖液<br>ドキシル注                        | 250<br>30 | mL<br>mg/m2 | 点滴静注 | 側管  | 60min  | ●    | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1) ドキシル投与前後でライフウォッチを行う。<br>2) 基本投与時間60min (1mg/minを超えない速度で投与 60min以上になる場合は医師に確認する。)<br>3) ライフウォッチ-を使用しないこと。<br>4) ドキシル投与量90mg未満の場合、5%糖液250mLを使用 ドキシル投与量が90mgを超える場合、5%糖液500mLを使用<br>5) 手足症候群予防のため手足をクール* する。 |
|    |                                      |           |             |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | 生理食塩液<br>カルボプラチン点滴静注液                | 500<br>5  | mL<br>AUC   | 点滴静注 | 側管  | 120min | ●    | — | — | — | — | — | — | — | — | — |                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                      |           |             |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                             |
| 6  |                                      |           |             |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                      |           |             |      |     |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                             |

備考欄

減量・中止基準

文献