

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 dd-TC (PTX+CBDCA) +BEV療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2014年2月6日	
疾患名	卵巣癌				1クール期間	21日	
診療科名	婦人科					実施回数	6~8/回
登録医師名	早瀬 良二						

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日									注意コメント	
							day1	—	—	day8	—	—	day15	—	—		—
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5	錠	経口			●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	パクリタキセル投与開始30分前までに内服
2	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを装着すること
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	レスタミンと同時投与（レスタミン内服不可患者には医師に確認）
	デキサート注射液 6.6mg	1.5	瓶														
4	ファモチジン注射液 20mg	1	管	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	
	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋														
5	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	フィルター付き点滴セット使用
	パクリタキセル注	80	mg/m2														
6	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	カルボプラチン点滴静注液	6	AUC														
7	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	90min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回90min、初回の忍容性が良好であれば2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば3回目以降30min
	アバスチン点滴静注用	7.5	mg/kg														
8																	

備考欄

減量・中止基準

文献

Efficacy and safety results from OCTAVIA,a single-arm phase II study evaluating front-line bevacizumab,carboplatin and weekly paclitaxel for ovarian cancer