

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

|        |              |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |        |           |  |
|--------|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
| レジメン名称 | 婦人科 EMA/CO療法 |  | 臨床区分                                                                                                                                                                                | 抗癌剤適応分類                                                                                                                                                                              | 登録日    | 2013年5月8日 |  |
| 疾患名    | 絨毛癌          |  | <input checked="" type="checkbox"/> 日常診療<br><input type="checkbox"/> 単施設自主研究<br><input type="checkbox"/> 他施設自主研究<br><input type="checkbox"/> 市販後臨床研究<br><input type="checkbox"/> 治験 | <input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法<br><input type="checkbox"/> 術後化学療法<br><input type="checkbox"/> 術前化学療法<br><input type="checkbox"/> 局所療法<br><input type="checkbox"/> その他 | 1クール期間 | 14日       |  |
| 診療科名   | 婦人科          |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | 実施回数   | /回        |  |
| 登録医師名  | 山本 暖         |  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |        |           |  |

| Rp | 薬品名称                                 | 標準投与量      | 単位          | 投与方法 | ルート | 投与時間   | 投与日  |      |      |   |   |   |      |   |   |   | 注意コメント                           |
|----|--------------------------------------|------------|-------------|------|-----|--------|------|------|------|---|---|---|------|---|---|---|----------------------------------|
|    |                                      |            |             |      |     |        | day1 | day2 | day3 | — | — | — | day8 | — | — | — |                                  |
| 1  | 生理食塩液                                | 100        | mL          | 点滴静注 | メイン |        | ●    | ●    | —    | — | — | — | ●    | — | — | — | 血管確保用<br>※開始から終了までECGモニターを装着すること |
| 2  | グラニセトロン点滴静注液3mgバック<br>デキサート注射液 6.6mg | 1<br>1     | 袋<br>瓶      | 点滴静注 | 側管  | 30min  | ●    | ●    | —    | — | — | — | ●    | — | — | — |                                  |
| 3  | 生理食塩液<br>エトボシド点滴静注液                  | 500<br>100 | mL<br>mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 120min | ●    | ●    | —    | — | — | — | —    | — | — | — |                                  |
| 4  | コスメゲン静注用<br>注射用水                     | 0.35<br>—  | mg/m2       | 点滴静注 | メイン | 10min  | ●    | ●    | —    | — | — | — | —    | — | — | — | コスメゲン静注用1Vにつき注射用水<br>1.1mLで溶解する。 |
| 5  | 生理食塩液<br>注射用メソトレキセート                 | 50<br>100  | mL<br>mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 10min  | ●    | —    | —    | — | — | — | —    | — | — | — |                                  |
| 6  | 生理食塩液<br>注射用メソトレキセート                 | 500<br>200 | mL<br>mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 12h    | ●    | —    | —    | — | — | — | —    | — | — | — |                                  |
| 7  | ロイコボリン注                              | 15         | mg          | 筋注   |     |        | —    | ●    | ●    | — | — | — | —    | — | — | — | メソトレキセート投与開始後24時間後<br>から12時間毎に投与 |
| 8  | ロイコボリン注                              | 15         | mg          | 筋注   |     |        | —    | ●    | ●    | — | — | — | —    | — | — | — | メソトレキセート投与開始後24時間後<br>から12時間毎に投与 |
| 9  | 生理食塩液<br>注射用エンドキサソ                   | 250<br>600 | mL<br>mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 60min  | —    | —    | —    | — | — | — | ●    | — | — | — |                                  |
| 10 | 生理食塩液<br>オンコピン注射用                    | 50<br>1    | mL<br>mg/m2 | 点滴静注 | メイン | 10min  | —    | —    | —    | — | — | — | ●    | — | — | — | 最大2mg/body                       |
| 11 |                                      |            |             |      |     |        |      |      |      |   |   |   |      |   |   |   |                                  |

備考欄

hCG測定 週1回

減量・中止基準

好中球 500以下延期  
血小板 5万以下で延期

文献