

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 FA (5-FU+ACT-D) 療法		臨床区分 ☒ 日常診療 ☐ 単施設自主研究 ☐ 他施設自主研究 ☐ 市販後臨床研究 ☐ 治験	抗癌剤適応分類 ☒ 進行・再発化学療法 ☐ 術後化学療法 ☐ 術前化学療法 ☐ 局所療法 ☐ その他	登録日	2013年12月7日
疾患名	絨毛癌				1クール期間	14~21日
診療科名	婦人科					
登録医師名	山本 暖				実施回数	/回

Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント
							day1	day2	day3	day4	day5	—	—	—	—	—	
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	血管確保用
2	グラニセトロン点滴静注液3mgバック	1	袋	点滴静注	側管	30min	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
	デキサート注射液 6.6mg	1	瓶														
4	コスメゲン静注用	0.5	mg/body	点滴静注	メイン	全開	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	コスメゲン静注用1Vにつき注射用水1.1mLで溶解する。
	注射用水	—															
5	生理食塩液	50	mL	点滴静注	メイン	8H	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	ワンバックに調製する。
	ソルデム3A輸液	1000	mL														
6	フルオロウラシル点滴静注	1500	mg/body	点滴静注	メイン		●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	

備考欄

減量・中止基準

文献

Salvage Combination Chemotherapy with 5-Fluorouracil and Actinomycin D for Patients with Refractory,High-Risk Gestational Trophoblastic Tumors