

国立病院機構 福山医療センター レジメン登録・管理表

レジメン名称	婦人科 GC (GEM+CBDCA) +BEV療法						臨床区分	抗癌剤適応分類						登録日	2014年1月9日			
疾患名	卵巣癌									<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療		<input checked="" type="checkbox"/> 進行・再発化学療法				1クール期間	21日	
診療科名	婦人科									<input type="checkbox"/> 単施設自主研究		<input type="checkbox"/> 術後化学療法		<input type="checkbox"/> 術前化学療法				
登録医師名	早瀬 良二									<input type="checkbox"/> 他施設自主研究		<input type="checkbox"/> 治験				実施回数	6/回	
Rp	薬品名称	標準投与量	単位	投与方法	ルート	投与時間	投与日										注意コメント	
							day1	—	—	day8	—	—	—	—	—	—		
1	生理食塩液	100	mL	点滴静注	メイン		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	血管確保用 ※開始から終了までECGモニターを 装着すること	
2	グラニセトロン点滴静注液3mgパック	1	袋				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	テキサート注射液 6.6mg	1	瓶				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
3	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	15min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—		
	ゲムジタピン点滴静注用	800~1000	mg/m2				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
4	生理食塩液	250	mL	点滴静注	側管	30min	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—		
	カルボプラチナ点滴静注液	4	AUC				●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
5	生理食塩液	100	mL	点滴静注	側管	60min	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	初回90min、初回の忍容性が良好であれば2回目60min、2回目の忍容性が良好であれば3回目以降30min	
	アバズチン点滴静注用	15	mg/kg				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
6																		

備考欄

減量・中止基準

文献

OCEANS : A Randomized,Double-Blind,Placebo-Controlled Phase III Trial of Chemotherapy With or Without Bevacizumab in Patients With Platinum-Sensitive Recurrent Epithelial Ovarian,Primary Peritoneal,or Fallopian